

抗生素糖漿衛教單張

❖ 藥品名稱

- 懸液粉 Azithrom 600mg 瓶 (菌巴達)
- 懸液粉 Zithromax 600 mg 瓶 (日舒)



❖ 臨床用途：抗生素

❖ 配製方法

1. 輕拍藥瓶將藥粉搖散，使用內附針筒狀量筒取 9 c.c冷開水加入藥瓶中充分搖勻溶解藥粉，即可泡製成 15 c.c的藥水。
2. 以針筒量取醫師指示藥量，再以針筒或所附湯匙餵食。
3. 通常一天一次，請於固定時間空腹服用(菌巴達懸液用粉可與食物併服)，請依醫師指示使用，勿自行增減藥量。
4. 每次服藥前請先徹底搖勻本懸浮液再使用。

❖ 保存及注意事項

1. 泡製成懸浮液後，室溫30 °C以下可保存5天(菌巴達可存放10天)。
2. 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤服。
3. 本品適用於細菌感染症，勿將本藥與他人分享。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802