

## Emgality 皮下針 120 mg

### ❖ 藥品名稱

恩疼停注射劑 Emgality 皮下針 120 mg

(每次劑量 120mg、一支可用一次。第一次需用兩支，之後每月一支)

成分：Galcanezumab 120 mg/mL/pen

### ❖ 藥品用途：預防成人偏頭痛。

### ❖ 藥品外觀



### ❖ 操作方法

<p>① 事前準備</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>皮下給藥前，讓 Emgality 在室溫下靜置三十分鐘。</li> <li>洗淨雙手，並檢查藥品保存期限，外觀澄清無色。</li> </ul>
<p>② 清潔注射部位</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用酒精棉片消毒腹部（距肚臍兩吋之外的區域）、大腿（鼠蹊部下方兩吋至膝蓋上方兩吋）、上手臂背面或臀部。</li> <li>每次更換注射部位。</li> <li>同時施打兩劑時，第二劑請注射於不同部位。</li> <li>勿注射於皮膚壓痛、瘀血、發紅或硬皮的部位。</li> </ul>
<p>③ 解鎖注射筆</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>確認注射筆已上鎖（上鎖環指示於上鎖位置）：基座蓋依箭頭方向旋開，注意勿碰觸針頭（基座蓋轉開後勿再蓋回）</li> <li>將透明基座平放，並緊壓皮膚→轉動上鎖環至解鎖位置。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 取下基座蓋時，針頭有一滴液體是沒關係的，仍可施打。</li> </ul> </li> </ul>

④  
注射

- 以大拇指壓下藍綠色注射鈕，聽到響亮的喀一聲後注射筆開始注射，繼續緊壓皮膚約 10 秒，聽到第二聲響亮的喀聲表示注射完成，此時在透明基座可看到灰色柱塞。
- 注射部位出血請以棉球或紗布按壓注射部位，請勿搓揉注射部位。
  - 注射期間可能會聽到輕微聲響，請勿移開注射筆，直到聽見第二聲響亮的喀聲。
  - 按住注射鈕不放至注射結束並非必要，但其有助於讓您將注射筆保持穩固且緊壓住您的皮膚。

⑤  
丟棄

- 注射完成後移開注射筆。
- 注射筆丟入防穿刺的容器內。

❖ 注意事項

1. 存放條件：

- 最好冷藏 2°C 到 8°C，不可冷凍，不可搖晃。且置於外盒內避免光照，直到注射前再取出。
- 如果置於原外盒內未冷藏、30°C 以下，最多可貯放七天。若未冷藏請勿再放回冰箱，超過 30°C 或超過七天未使用請丟棄。

2. 如果有漏打情形發生，請儘快注射遺漏掉的劑量。然後，在您最後一次給藥的一個月後注射本藥，以重新回到每月一次的用藥時程。

舉例：若您是每月一日固定施打本藥，在十七日才想到忘記施打時，請立即注射本藥。並於次月十七日施打下一次療程。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802