


Fentora 吩妥拉口頰錠

❖ 藥品名稱：Fentora Buccal tab 100 mcg

成分：Fentanyl 100 mcg/tab (強力鎮痛藥)



❖ 藥品用途：

適用於18歲以上，對正在規律使用日夜連續型(around-the-clock)鴉片類藥物來治療癌症相關的持續性疼痛且有耐藥性的癌症患者所發生的突發性疼痛

❖ 使用方法

1. 確認要使用藥品時，小心將鋁箔撕開並取出藥錠。

注意：勿硬將藥錠從包裝中擠出，避免藥錠損壞。

2. 取出藥錠後，應立即將整個吩妥拉口頰錠放在口頰中(臉頰和牙齦之間的白齒之上，如上圖)，或將整個藥錠放在舌頭下直到溶解(約14-25分鐘)。

注意：不可將藥錠剝半、吸入、咀嚼或整顆吞服，避免降低療效。


注意：每次使用吩妥拉口頰錠時，應交替使用口頰兩側。

3. 使用30分鐘後，若仍有藥錠殘留，可配一杯水將殘餘的藥錠吞下。

4. 每一次突發性疼痛發作，最多可以使用兩次劑量。

(1) 如果突發性疼痛在發作30分鐘後仍不能緩解，可再使用一次相同強度的額外劑量來緩解同一次發作。

(2) 必須等待至少4小時才能再次使用，治療另一次突發性疼痛的發作。



❖ 用藥注意事項

1. 吩妥拉口頰錠與其他同成分製劑(ex：Painkyl平舒疼口頰溶片)不具有生體相容性，故不可將用量以等劑量方式轉換。(目前尚無劑量轉換資料)

2. 吩妥拉口頰錠禁止使用於急性或術後疼痛(包括頭痛/偏頭痛、牙痛)。避免因為對鴉片類藥物沒有耐受性而造成危及生命的換氣不足。

3. 若出現呼吸抑制的症狀，如呼吸速率下降，深呼吸之間有異常的長時間停頓，建議先停藥回診。

提醒：此藥品有鎮靜作用，請避免與酒精、安眠藥或鎮靜劑同時使用，並應小心執行需要高度注意力之活動(如駕駛或使用重型機械)。

4. 若需要停止使用本藥錠，建議逐漸停藥。避免突然停藥產生戒斷症狀(停藥後更加不適)。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802

最後更新日期：2019/02/20