

Fortacin 噴霧劑

❖ 藥品名稱

Fortacin 賦久勁外用噴霧劑

成分：Lidocaine/Prilocaine (150/50mg)




藥品用途：治療成年男性之原發性早發性射精。



❖ 藥品外觀

為一附噴頭之外用噴霧劑，瓶身通常為金屬銀色。

❖ 操作方法

| | | |
|----------------------|--|---|
| <p>1.事前準備</p> | <p>建議於行房前5分鐘使用。</p> <p>使用前先<u>搖晃藥瓶</u>，並褪下包皮。</p> <p>第一次使用前應先搖晃瓶身後排空。</p> |  |
| <p>2.按壓藥瓶</p> | <p>手持藥瓶，以不同角度對準龜頭<u>按壓三下</u>氣閥，讓藥品完整包覆龜頭。(一次劑量為三下)</p> |  |
| <p>3.擦去藥液</p> | <p>使用藥品5分鐘後，用紙巾擦去多餘藥液便能降低龜頭的敏感度。</p> <p>若有需要使用保險套可在藥液擦除後戴上。</p> |  |

❖ 注意事項

1. 使用後應置於 15-25°C 陰涼處儲存，不可置於冰箱。
2. 24小時內最多可使用3劑，每一次使用相隔至少4小時。
3. 此藥品可能會對眼睛產生刺激感，若藥品不慎接觸到眼睛，請立即以水或生理食鹽水沖洗眼睛，直至無不適感止。
4. 藥品若不慎沾到口腔、鼻黏膜、喉嚨、女性生殖器和肛門等部位，可能會造成局部麻木感並降低痛覺，增加受傷的風險。
5. 由於有轉移至伴侶身上風險，期望達成受孕的病人應避免使用 Fortacin，或者如欲作性器接合，應在噴上噴霧5分鐘後但從事性交前，盡可能徹底洗淨龜頭。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802

最後更新日期：2022/9/9