




## Foster NEXThaler 乾粉吸入劑

### ❖ 藥品名稱

- 肺舒坦耐舒樂乾粉吸入劑  
Foster NEXThaler 100/6mcg/dose

成分：

抗發炎 Beclomethasone 100 mcg/次  
支氣管擴張劑 Formoterol 6 mcg/次



### ❖ 操作方法

1. **取出吸入劑** 穩穩拿出吸入劑，並呈現直立狀態。  
在第一次拿到Foster吸入劑時，劑量計數器的數字顯示為120。
2. **開啟保護蓋** 將保護蓋「完全」打開，即表示已填充一次劑量。
3. **呼氣** 握住吸入劑盡量呼氣。  
(不要將吸入劑靠近嘴邊，以避免將氣吹入吸口)
4. **吸入藥物** 雙唇確實緊含吸口(應避免手指擋住通氣孔)，並快速深吸一口氣。  
移開吸入劑，閉氣 5-10 秒後緩慢呼氣，完成一次吸入動作。如果不確定藥物是否全數吸入，可再重複一次。
5. **關閉保護蓋** 蓋上保護蓋，並「完全」蓋緊。此時劑量計數器的數字已減少 1 單位
6. **漱口** 使用吸入劑後，以水漱口，並將水吐出。

### ❖ 注意事項

1. 應儲存於 30°C 環境下，開封後應按醫囑使用，最遲六個月應將吸入劑丟棄。
2. **【提醒】**必要時才能打開吸入劑的保護蓋。如果已打開保護蓋再關上，但又未吸入藥物，則蓋上保護蓋時，藥劑會退回吸入劑內的藥粉儲存槽，故下一劑藥物仍可安全地吸入(外殼上窗口所顯示的劑量數不會減少)。
3. 應避免搖晃吸入劑及對吸口吹氣。使用時應避免手指擋住通氣孔。
4. 當劑量計數器顯示數字為 0 時，即表示吸入劑中已無劑量。
5. 當劑量計數器顯示數字低於 20 時，請回診。
6. 以乾布定期清潔吸嘴(每週 2~3 次)，絕對不可用水清洗吸嘴。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802