




# Metered Dose Inhaler 定量噴霧吸入劑


衛教短片

## ❖ 藥品名稱

- 肺舒坦定量吸入劑 Foster 120 dose
- 倍勞喘定量吸入劑 Berotec N 200 dose
- 哮寶 定量吸入劑 Trimbow 120 dose
- 輔舒酮優氣吸入劑 Flixotide 120 dose
- 使肺泰優氣吸入劑 Seretide EVOhaler 120 dose
- 欣必復氣化噴霧劑 Synbufo 120 dose
- 必肺暢氣化噴霧劑 Breztri 120 dose



## ❖ 操作方法

1. 開 移去護蓋、搖晃吸入劑數次使藥物均勻。  
*\*若初次使用需對空試噴2次；**Breztri 必肺暢**請按壓4次。*
2. 吐 盡量呼出肺部裡的空氣。
3. 吸 如圖所示拿住吸入劑，並以雙唇確實緊含含嘴。按壓容器的底部以釋出一個定劑量，同時盡可能緩慢而深地吸氣。  

4. 停 憇氣5-10秒後，即可正常呼吸；若需要使用第二次，需重複2-3步驟。使用完畢需蓋上護蓋。
5. 漱 若您使用的是**Foster 肺舒坦**、**Trimbow 哮寶**、**Flixotide 輔舒酮**、**Seretide 使肺泰**、**Synbufo 欣必復**、**Breztri 必肺暢**，使用後須以水漱洗口腔，並將水吐出。

## ❖ 注意事項

1. 藥品請於室溫環境下儲存，**Foster 肺舒坦**、**Trimbow 哮寶**未開封時需冷藏。
2. 若無計量視窗，可估算大略使用完畢之天數後、規劃回診日期。
3. 應至少每周清潔一次吸入器的含嘴部位，確保藥物不會堆積阻塞在吸入器內。
4. 應先取下護蓋並移去藥罐，才可以使用溫水清洗吸入器；清洗完畢後甩一甩、使吸入器自然陰乾，再裝回藥罐。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。  
天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802