



Nitrostat 耐絞寧舌下錠

❖ 藥品名稱

○ Nitroglycerin 0.6mg

❖ 藥品作用：

1. 具有血管擴張作用，可用於預防或緩解心絞痛的急性症狀。
2. 當您感到胸悶、胸痛或呼吸困難時，即可使用此藥物。



❖ 用法用量：

1. 請於心絞痛發作時放置一粒耐絞寧舌下錠於**舌下**（非含於舌上）或**口腔頰**中，使其融化吸收。
2. 在症狀緩解前，每隔5分鐘重複用一粒，最多含第3顆。
注意：若在15分鐘內服用3粒後仍舊感到胸悶、胸痛則應立即就醫。
3. 耐絞寧作為預防使用時，可在從事可能引起心絞痛發作的活動前5-10分鐘服用

❖ 用藥注意事項

1. 耐絞寧不可吞服，只能於舌下使用。
置於舌下時，可能會有灼燒或刺痛感，但此感覺不可用來判斷藥品是否有效。
2. 用藥後可能會導致暈眩或頭痛等症狀，此為藥效發揮之常見反應。
最好坐下服藥，且用藥後應避免從事機械操作、開車等需集中注意力之工作，以免因頭暈而發生危險。
3. 此藥物勿與威而剛（Viagra®）、樂威壯（Levitra®）、犀利士（Cialis®）併用。
以免產生藥物交互作用，造成致命性低血壓。

❖ 藥品保存

1. 耐絞寧應置於原玻璃容器內，並將瓶蓋蓋緊，儲存於乾燥室溫環境，避免藥品長時間接觸空氣、濕、熱，而降低藥效。
注意：請隨身攜帶，但不宜貼身存放（勿放在口袋），以免過熱降低藥效。
2. 開封後六個月，未使用的藥粒應丟棄，並請醫師重新開一瓶。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802