

Natesto 耐他妥 鼻內凝膠劑

❖ 藥品名稱

○ 耐他妥 鼻內凝膠劑 Natesto

成分： 睪固酮 Testosterone

規格：每支11公克、每按一次擠出之凝膠為
5.5毫克，每劑為左右兩個鼻孔各按一次。



❖ 操作方法

1. **排空** 第一次使用前，先將給藥器倒轉，對著洗手台按壓幫浦10次，用溫水沖洗流出的凝膠。若無凝膠流出，請用乾淨乾燥的衛生紙擦拭前端。
2. **拿下護蓋** 拿下給藥器的蓋子，並將鼻涕擤乾淨。
3. **插入鼻內** 看著鏡子，將右手手指放在幫浦上，緩緩插入左側鼻孔內，直到手指碰到鼻子底部。
4. **給藥** 將管口向外傾斜，接觸到鼻孔內壁後，緩緩按下幫浦直到停止。
5. **取出裝置** 取出管口時沿著內壁擦拭，確保所有凝膠都留在鼻內。結束後在另一側鼻孔重複相同動作，完成一次劑量。
6. **按摩** 在鼻樑下方不遠處輕輕按壓，使兩邊鼻孔靠近。

❖ 注意事項

1. 左右鼻孔分別給藥一次後，即完成一劑給藥量。每劑用藥需間隔至少6小時。
2. 此藥僅使用於鼻腔內。若藥物接觸到其他部位，請用溫水和肥皂清潔。
3. 保存於室溫下(攝氏25度)，放置於兒童碰觸不到的地方。
4. 清潔時，用乾燥且乾淨的衛生紙擦拭管口前段。
5. 給藥後1小時內應避免擤鼻涕或用鼻子用力吸氣。
6. 將容器周圍的外瓣打開，即可看見剩餘藥量。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802