

## 口服抗病毒藥品 Paxlovid 錠劑

### ❖ 藥品名稱

○ Paxlovid 由 2 種藥物組成：PF-07321332 和 ritonavir。

### ❖ 用法用量

針對每次劑量，同時服用所有 **3 顆** 錠劑：

**1 顆** 白色 ritonavir 錠劑 和

**2 顆** 粉紅色 PF-07321332 錠劑



每天口服 **2 次** (早上和晚上)，**持續服用 5 天**。

**注意：**如果您患有腎臟疾病，請與您的醫療照護提供者討論。您可能會需要不一樣的劑量。

### ❖ 使用方式

1. 可隨食物或空腹服用。
2. 錠劑**應整顆吞服**。切勿咀嚼、破壞或壓碎。

### ❖ 用藥注意事項

1. 忘記服藥時：

- 如果從漏服藥物算起**不到8小時**，請於記起時**立即服藥**。
- 如果從漏服藥物算起**已超過8小時**，請**跳過漏服的劑量**，於下一個排定的時間服用您的藥物。

**注意：****不可服用**兩倍劑量來彌補漏服的劑量。

2. 目前沒有使用 PAXLOVID 治療懷孕女性或正在哺乳中母親的經驗。

對於母親和未出生的嬰兒，服用 PAXLOVID 的效益可能超過治療的風險。

**注意：**如果您已懷孕，請與您的醫療照護提供者討論您的選項和具體情況。

3. 可能副作用包括：肝臟問題、味覺改變、腹瀉、肌肉疼痛。

**注意：**如果您發生任何對您造成困擾或持續未緩解的副作用，請聯繫您的醫療照護人員。

4. 如果有以下情況，**請勿服用 PAXLOVID**，並立即諮詢醫師或藥師：

- 您對本藥品中的任何成分過敏。
- 您正在使用以下任何一種藥物：
  - $\alpha$  1-腎上腺素能受體拮抗劑：alfuzosin
  - 鎮痛藥：pethidine、piroxicam、propoxyphene
  - 抗心絞痛藥：ranolazine
  - 抗心律不整藥：amiodarone、dronedarone、flecainide、propafenone、quinidine
  - 抗痛風：colchicine
  - 抗精神病藥：lurasidone、pimozide、clozapine
  - 麥角衍生物：dihydroergotamine、ergotamine、methylergonovine
  - HMG-CoA 還原酶抑制劑：lovastatin、simvastatin
  - PDE5 抑制劑 (治療肺動脈高壓)：sildenafil (Revatio)
  - 鎮定/安眠藥：triazolam、oral midazolam
  - 抗癲癇藥：carbamazepine、phenobarbital、phenytoin
  - 抗癌藥：apalutamide
  - 抗分枝桿菌藥物：rifampin

## ❖ 藥品保存

儲存在室溫25°C以下。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802

最後更新日期：2022/5/26