



衛教短片

PREMARIN陰道乳膏


❖ 藥品名稱

○ 普力馬林陰道乳膏

Premarin Vaginal Cream 14G


成分：

結合型雌激素Conjugated Estrogen (CE) Concentrate 0.625mg/g



❖ 操作方法

1. 洗淨雙手 使用前，請先將雙手洗淨。
2. 裝軟管 將藥膏前蓋子轉開，以旋轉的方式將軟管拴緊於藥膏前端出藥口。
3. 取藥 依照醫師或藥袋上指示，將軟管拉至所需使用量之刻度。擠壓藥膏後端，將藥物填滿於拉開軟管後產生的空腔中，並將軟管以旋轉方式取下。
4. 塗藥 平躺雙膝彎曲或以舒適的姿勢，將取下後軟管置入陰道中約一根手指深度，慢慢按壓軟管後端，推出藥物至陰道內。
5. 平躺 取出軟管，平躺5-10分鐘。
6. 清洗 以清水或肥皂水清洗軟管，置於通風乾燥處晾乾，以供下次使用。



❖ 注意事項

1. 若有子宮內膜癌、心血管疾病、乳癌等，請在使用乳膏前告知醫師。
2. 不可使用於已知或懷孕婦女。
3. 此藥物非塗抹於皮膚，此藥物為陰道給藥。
4. 請保存於溫度20°C至30°C環境。
5. 勿用熱水清洗軟管。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802

最後更新日期：2022/09/19