

Rybelsus 瑞倍適錠

❖ 藥品名稱

- Semaglutide 14mg。

❖ 藥品作用

用於改善第二型糖尿病成人的血糖控制。

❖ 使用時間

每日一次。如醫師未特別囑咐，可於早上起床空腹服用。

❖ 使用方式

1. 應空腹服用。
2. 應搭配少量的水：最多半杯，相當於120毫升(小瓶養樂多約100毫升)。
3. 應整顆吞服。不要將錠劑剝半、壓碎或咀嚼。
4. 服藥後，應等待至少30分鐘再進食、喝水或服用其他藥物。

❖ 用藥注意事項

1. 忘記服藥時：請跳過，隔天再空腹服用下一劑。
2. 可能副作用：低血糖、噁心、腹瀉、嘔吐。

注意：低血糖症狀包含顫抖、心悸、冒冷汗、飢餓感。

注意：如果您發生任何對您造成困擾或持續未緩解的副作用，請聯繫您的醫療照護人員。

❖ 藥品保存

請存放於室溫(低於30°C)。因不耐濕氣及光線，尚未服用前請勿將藥品從鋁箔封膜拿出。



以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802

最後更新日期：2022/5/30