

Tamiflu 75mg 克流感或 Eraflu 75mg 易剋冒膠囊

<成分>

Oseltamivir 75mg

<作用>

用於流行性感冒之治療。

<常見副作用>

噁心、嘔吐、頭痛、腹瀉

<建議劑量>

1歲或以上孩童：一天2次，為期5天。

體重	每次用藥劑量	總量
≤15 公斤	30 mg (0.4 顆)	4 顆
>15-23 公斤	45 mg (0.6 顆)	6 顆
>23-40 公斤	60 mg (0.8 顆)	8 顆
>40 公斤	75 mg (1 顆)	10 顆

<泡製說明>

無法吞服克流感或易剋冒膠囊患者可將膠囊剝開，將其藥粉依以下說明與冷開水調製成適當劑量的口服懸浮液服用。

1. 將所有克流感或易剋冒膠囊自鋁箔中取出。
2. 加入半瓶 (約 50c.c.) 冷開水，所有克流感或易剋冒膠囊剝開，將其藥粉全部倒入瓶內，膠囊外殼丟棄。
3. 加入冷開水至藥瓶上 100c.c. 的刻度。
4. 蓋上瓶蓋，用力振搖，使口服懸浮液藥水混合均勻。
5. 量杯量取所需刻度服用。

<用法>

克流感或易剋冒口服懸浮液，每次 10c.c.，一天 2 次，共 5 天。

<注意事項>

- ❖ 配置後的口服懸浮液容易沉澱，每次使用前應先搖晃均勻，再以量杯量取所需用量服用。
- ❖ 儲存條件：泡製後的口服懸浮液，建議冷藏於冰箱(2-8°C)中，5 天內服用完畢。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802