

Vimax 可易適泡沫液 0.05% 25mL

❖ 藥品名稱

○ Clobetasol 0.05% 25mL

❖ 適應症：牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。

❖ 用法用量：

每日1-2次，輕擦於患部，情況改善後即應停止用藥。

注意：治療超過四周後若未再複診，請停止治療。若使用於孩童，建議每週複診。



❖ 使用方式

1. 使用時請握住鋁罐，**垂直倒立90度**，按下噴嘴即可順利擠出泡沫慕斯。

2. 請將泡沫液擠在**杯蓋**內，再用手指挖取適量泡沫液塗抹患部。

注意：為避免藥物使用過量，請不要直接將泡沫液擠在患部。

❖ 用藥注意事項

1. 罐內除了有效成分，還充填了高壓推進氣體，**勿隨意搖晃**，以免過多的氣體混入有效成分中，導致罐內氣體壓力不足，而無法擠出泡沫液。

2. 塗敷於眼皮時應小心，避免讓藥物進入眼睛以免造成青光眼。

3. 忘記用藥想起時，應儘快補用。若已經接近下次用藥時間，請跳過一次，於下次用藥時間依正常劑量使用即可，**切勿同時使用兩倍劑量**。

4. 當內容物快用完時，擠出的泡沫液會呈現不完整斷續狀，但罐內仍有殘留液化氣體，請按壓噴嘴排空氣體，空罐交由資源回收車回收即可。

❖ 藥品保存

1. 請放置25°C以下陰涼處儲存，勿放於日曬處、廚房、浴室、車內等高溫處所。

2. 不可長期放在冰箱，低溫會使內容物油水分離並堵塞噴嘴。

❖ 可能副作用

1. 長期大量使用於廣泛部位會造成全身性吸收，產生腎上腺皮質機能亢進現象。
2. 長期密集使用會造成皮膚局部萎縮性變化，如皮膚變薄、產生皺紋及表皮血管擴張。若出現以上情形，請告知您的醫師或藥師。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8801

最後更新日期：2022/8/2