



## Nasal spray 鼻噴劑



類固醇鼻噴劑

抗組織胺鼻噴劑

鼻黏膜血管收縮劑



衛教短片



Avamys

### ❖ 藥品名稱

- 艾敏釋鼻用噴液懸浮劑 Avamys 27.5mcg/dose 120d (類固醇)
- 噴立停鼻用噴液劑 Azetin 140mcg/dose (抗組織胺)
- 帝伏寧定量鼻噴懸液劑 Dufanas 137/50mcg/dose  
(Azelastine hydrochloride : 抗組織胺 / Fluticasone propionate : 類固醇)
- 迷你寧鼻腔噴霧劑 Minirin 10mcg/Dose 25d
- 內舒拿水溶性鼻用噴液劑 Nasonex 50mcg/dose (類固醇)
- 醫鼻易鼻用噴液劑 Sindecon 0.05% 10ml (血管收縮劑)
- 特索寧水性鼻用噴液劑 Trisonin 55mcg 120d (類固醇)

### ❖ 操作方法

#### 1. 搖

第一次用藥開封前須充分搖動藥瓶，並先對空噴壓數次，直到有藥劑噴出為止，確保噴出藥劑量均一。（下次使用若間隔 72 小時，需重複此動作。）



#### 2. 洗

使用鼻噴劑前先清潔鼻腔，讓噴霧能順利進入鼻腔，發揮最好效果。



#### 3. 直

使用時頭部保持直立，並稍微前傾，可避免藥品流入口腔。

#### 4. 壓

將噴頭放入一側鼻孔中並朝向鼻翼，並以手指按壓另一側鼻孔，完整按壓鼻噴劑一次，輕輕吸氣後閉氣數秒，以增加藥品在鼻腔滯留時間。



#### 5. 蓋

過程中若不慎流入口腔中，請立即漱口。如須第二噴，請隔 30 秒，重複步驟 4。使用完畢後，以乾淨紙巾清潔噴嘴，並確實蓋回蓋子。



## ❖ 注意事項

1. 由於皮質類固醇對傷口癒合的抑制作用，近期內曾有鼻潰瘍、鼻手術或鼻外傷的患者在傷口癒合前不應使用艾敏釋(Avamys)鼻噴劑。
2. 類固醇鼻噴劑作用較緩慢，需要使用長達一週才達最佳效果。
3. 抗組織胺鼻噴劑作用較快，但效用較弱。
4. 鼻粘膜血管收縮劑適用於短期或救急使用，**不建議使用超過七天**，否則易產生反彈性鼻炎。
5. 不可自行更改劑量，或與他人共用藥品。
6. 室溫保存，須避免高溫或潮濕處。
7. 噴頭部位用衛生紙擦乾淨即可，不需用水清洗。
8. 藥品不需冷藏，除非藥袋上有特別指示。
9. 藥品變色不可使用。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802

最後更新日期：2022/09/15